

月 旬	6			7			8			9			10											
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下									
生育 ステージ	育苗期			活着期			有効分げつ期			幼穂 形成期			穂の 成育期			出穂期			登熟期			成熟期		
水 管 理	元気つくし				← たん水 → 間断かん水 → 中干し → 間断かん水 → たん水 → 間断かん水 → 落水												※落水時期は、刈取 作業に支障がない 範囲でできるだけ 遅くする。 収穫7～10日前							
	ヒノヒカリ				← たん水 → 間断かん水 → 中干し → 間断かん水 → たん水 → 間断かん水 → 落水																			
主な作業内容	元気つくし	基肥施用 育苗箱防除			田植え 除草剤散布			中干しは田面が 白く乾かないよう 6～7日程度行う(20本/株)			穂肥① 穂肥② 病害虫防除Ⅰ 病害虫防除Ⅱ			適期収穫			刈 取 適 期 品 種 名 籾 水 分 黄 化 籾 元気つくし 22～28% 70%以上 ヒノヒカリ 22～28% 70%以上							
	ヒノヒカリ	田植え									穂肥①			適期収穫										

刈り遅れを
なくそう。

〈スクリンゴカイ〉	〈紋枯れ病〉	〈いもち病〉	〈コブノメイガ〉	〈セジロウナカ〉	〈トビイロウンカ〉	坪枯れ被害	被害株	〈ミナミアオカメムシ〉
								

◎初・中期除草剤					◎追肥一発の場合				
剤 型	薬 剤 名	使 用 時 期	10a当たり散布量	使用上の注意	一発肥料の場合		基 肥		追肥一発の場合
粒 剤	エンペラー 1キロ粒剤	移植直後～ノビエ3葉期	1kg	移植同時処理が可能である。	元ヒー発1号		ちくごのめくみ444		ワンショット エムコート206
	トップガンR 1キロ粒剤	移植直後～ノビエ3葉期	1kg		NK2号				
	サラブレッドKAI 1キロ粒剤	移植直後～ノビエ2.5葉期	1kg						
ジャンボ剤	エンペラージャンボ	移植直後～ノビエ3葉期	10パック	湛水状態(5～6cm)を保つ。	成分(N-P-K)		20-10-10		20-0-16
	トップガンR ジャンボ	移植直後～ノビエ2.5葉期	10パック		元 気 つ く し		35		15
	サラブレッドKAI ジャンボ	移植直後～ノビエ2.5葉期	10パック		ヒノヒカリ		35		15
フロアブル剤	エンペラー フロアブル	移植直後～ノビエ3葉期	500ml	移植同時処理が可能である。					
	トップガンR フロアブル	移植直後～ノビエ3葉期	500ml						
	サラブレッドKAI フロアブル	移植直後～ノビエ2.5葉期	500ml						
豆つぶ剤	エンペラー 豆つぶ250	移植直後～ノビエ3葉期	250g						

◎中・後期除草剤						品種特性表							
雑草の種類	使用する農薬	使用量(10a当たり)		使用時期	収穫前日数	品 種 名	出 穂 期	成 熟 期	稈 長	耐 倒 伏 性	食 味	10 a 当り 収量	耐 病 性 いもち
イネ科雑草	クリンチャー 1キ口粒剤	1kg	湛水	移植後7日～ノビエ4葉期	30日前まで								
広葉雑草	バサグラン粒剤	3～4kg	落水	移植後15日～55日	60日前まで								
イネ科・ 広葉雑草	レプラスジャンボ	10バック	湛水	移植後14日～ノビエ4葉期	60日前まで	元気つくし	月・日 8.17	月・日 9.23	85 ^{cm}	やや弱	上の上	543 ^{kg}	弱
	ハイカット 1キ口粒剤	1kg	湛水	移植後15日～ノビエ3.5葉期	60日前まで	ヒノヒカリ	月・日 8.27	月・日 10.7	84 ^{cm}	やや弱	上の中	555 ^{kg}	やや弱
	クリンチャーバスME液剤	1000ml(水70～100ℓ)	落水	移植後15日～ノビエ5葉期	50日前まで								

令和3年産水稻栽培管理記入欄

★「作付品種名」「作付面積」「主な作業月日」を記入して下さい。

品 種 名 作付面積	5月		6月		7月			8月			9月			10月			
	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
元気づけし a	種子消毒	播種	田植え		雑草防除		穂肥		病害虫防除		出穂日		病害虫防除		収穫		
作業月日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日		
ヒノヒカリ a	種子消毒	播種	田植え		雑草防除		穂肥		病害虫防除		出穂日		病害虫防除		収穫		
作業月日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日		

- 生産資材の選択
 - 種子更新100%
 - 使用する肥料、農薬等の資材は、原則としてリストに記載されているもの
- 肥培管理及び除草、病害虫防除
 - 施肥基準及び農薬の安全使用基準の遵守
- 収穫、出荷
 - 適期収穫と麦粒の混入防止
- 生産履歴の記帳・点検
 - 栽培管理表に記入漏れや間違いがないかの確認
 - 栽培管理表は自己点検チェックシートと一緒に提出
- 分別出荷・表示及び不適合品
 - 要件を満たさない米は、JA米として扱われませんので注意しましょう。

★農薬は保管庫等に入れるなどして、きちんと管理しましょう！

★生産履歴記帳により安全・安心で品質の良い米を消費者に届けよう!!

●農家自ら進めよう。米の消費拡大！ ●農薬購入の際は印鑑が必要です。
●稲ワラ・麦ワラは流出防止や土づくりのため、堆肥と交換するか全量すき込みましょう！