

# 水稻・大豆栽培情報 9月号－2

令和4年9月13日  
J A 柳 川  
南筑後普及指導センター

## 【水稻】

### 1 収穫時期

今後の気温が平年並みに推移した場合の予想収穫時期は、下表のとおりです。ほ場ごとに生育を確認し、適期収穫に努めましょう。

品種	出穂期	予想収穫時期	収穫適期の目安
元気つくし	8月20日	9月28日頃～	黄化もみ比率 70%
ヒノヒカリ	8月28日	10月6日頃～	
実りつくし	9月1日	10月16日頃～	もみ水分 25%前後
ヒヨクモチ	9月7日	10月24日頃～	

※出穂期及び予想収穫時期は「元気つくし」、「実りつくし」は6月20日、「ヒノヒカリ」、「ヒヨクモチ」は6月24日植えの目安です。

※今後の気象条件により、収穫適期は前後することがあります。

※収穫作業については、各地区のCE計画に従って下さい。

### 2 水管理

落水時期までは、間断かん水を行い、根の活性を保ちます。中干しの弱いほ場や乾きが悪いほ場は、やや長めに干す等、水管理を工夫します。ただし、倒伏の程度が大きいほ場では、落水時期までほ場が乾かない程度の水管理を行ってください。

落水時期の目安は、収穫の7～10日前です。早期落水は玄米の充実低下を招くため、収穫作業に支障のない範囲で落水時期をできるだけ遅らせます。

## 【大豆】

### 1 病虫害防除

本年は、カメムシ類の発生が例年より多くなっています。カメムシ類に吸汁されると、品質の低下・減収につながるほか、加害程度が大きいと青立ちになります。被害防止のため、下表のとおり防除を行います。

〈補正防除〉

薬剤名	防除時期	希釈倍数	使用回数	使用時期
スタークル顆粒水溶剤	9月26日 ～ 10月10日	2,000倍 /100L	2回以内	収穫7日前まで

#### 農薬使用上の注意

- 1 散布前に必ず農薬ラベル(①適用作物、②使用量や希釈倍数、③使用時期や総使用回数、④有効期限 等)を確認!
- 2 散布時には近隣作物や住宅街への飛散防止を徹底!
- 3 散布後は必ず散布器具(タンク、ホース等)を洗浄!
- 4 防除履歴の正確な記帳!