

定期的には場巡回を行い生育を把握し適期管理に努めましょう。

月旬

6

7

8

9

10

上中下

上中下

上中下

上中下

上中下

生ステージ

育苗期

活着期

有効分げ時期

幼穂形成期

穂の成育期

出穂期

登熟期

成熟期

水管理

元気づくし

ヒノヒカリ

実りつくし

たん水

間断かん水

中干し

間断かん水

たん水

間断かん水

落水

※落水時期は、刈取作業に支障がない範囲でできるだけ遅くする。
収穫7～10日前

主な作業内容

元気づくし

ヒノヒカリ

実りつくし

田植え

育苗箱防除

基肥施用

除草剤散布

7～10日程度行い(20本/株)白く乾かないよう中干しは田面が

穂肥①

穂肥②

病害虫防除Ⅰ

病害虫防除Ⅱ

▲出穂期

▲出穂期

▲出穂期

間断かん水の目安

排水良好な田では4日灌水3日落水

排水不良な田では3日灌水4日落水

適期収穫

適期収穫

刈り遅れをなくそう。

刈取適期

品種名	籾水分	黄化籾
元気づくし	23～28%	70%以上
ヒノヒカリ	22～28%	70%以上
実りつくし	22～26%	70%以上

時期

播種時(覆土前)～移植当日

移植後収穫60日前まで

出穂30日前～5日前まで

8月上旬～中旬(栽培情報参照)

8月下旬(栽培情報参照)

9月上旬(栽培情報参照)

対象病害虫

ウンカ類、コブノメイガ、いもち病(防人箱粒剤のみ)

スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)

いもち病

ウンカ類、カメムシ類、いもち病

ウンカ類、カメムシ類、コブノメイガ、いもち病、紋枯病

ウンカ類、カメムシ類

病害虫防除(基本)

元気づくし

実りつくし

ヒノヒカリ

防人箱粒剤 50g/箱(いぐさ栽培予定水田使用不可(苗床・移植等))

スクミノン 1～4kg/10a

コラトップジャンボP 10～13パック/10a

フェルテラゼクサロン箱粒剤 50g/箱

粉剤体系

ビームアブロードスタークル粉剤5DL 4kg/10a

液剤体系

ビームエイトゾル 1,000倍

オーケストラスタークルエアー 1,000倍

無人航空機体系

ビームエイトゾル 8倍

オーケストラスタークルエアー 8倍

0.8ℓ/10a

粉剤体系

ノンブラストレバリダ粉剤DL 4kg/10a

液剤体系

ノンブラスバリダフロアブル 1,000倍

トレボンEW 1,000倍

無人航空機体系

ノンブラスバリダフロアブル 8倍

トレボンエアアー 8倍

0.8ℓ/10a

粉剤体系

エクシード粉剤DL 3kg/10a

液剤体系

エクシードフロアブル 2,000倍 100ℓ/10a

無人航空機体系

エクシードフロアブル 16倍 0.8ℓ/10a

〈スクミリンゴガイ〉

〈紋枯病〉

〈いもち病〉

〈コブノメイガ〉

〈セジロウンカ〉

〈トビイロウンカ

坪枯れ被害

被害株〉

〈ミナミアオカメムシ〉

除草剤防除基準

イグサ近隣田では使用しない。

◎初・中期一発除草剤

剤型	薬剤名	10a当り使用量	使用時期	使用上の注意点
粒剤	エンペラー 1キログラム粒剤	1kg	移植直後～ノビエ3葉期	移植同時処理が可能である。
	トップガンR 1キログラム粒剤	1kg	移植直後～ノビエ3葉期	
	サラブレッドKAI 1キログラム粒剤	1kg	移植直後～ノビエ2.5葉期	
ジャンボ剤	エンペラージャンボ	10パック	移植直後～ノビエ3葉期	湛水状態(5～6cm)を保つ。
	トップガンR ジャンボ	10パック	移植直後～ノビエ2.5葉期	
	サラブレッドKAI ジャンボ	10パック	移植直後～ノビエ2.5葉期	
フロアブル剤	エンペラー フロアブル	500ml	移植直後～ノビエ3葉期	移植同時処理が可能である。
	トップガンR フロアブル	500ml	移植直後～ノビエ3葉期	
	サラブレッドKAI フロアブル	500ml	移植直後～ノビエ2.5葉期	
豆つぶ剤	エンペラー 豆つぶ250	250g	移植直後～ノビエ3葉期	

使用上の注意事項

●使用基準を厳守し、適正な使用に努め、降雨直前、直後の処理は避ける。
●散布時に田面を露出させないように注意する。また、藻やワラクズなどの浮遊物がある状態では効果が落ちるので取り除く。
●散布後は、3～5cmの湛水状態を保ち、7日間は、水を落とさない。
●薬害のおそれがあるので、漏水田での使用や散布直後の補植、極端な深植や浅植、軟弱苗の使用は避ける。
●移植同時処理は、薬害が出やすいので、処理後できるだけ早く入水し、オーバーフローが起こらないように止水する。
(除草効果安定、薬害軽減のため)土の戻りが悪いところでは使用しない。

◎中・後期除草剤

雑草の種類	薬剤名	10a当り使用量	使用時期	収穫前日数
イネ科雑草	クリンチャー 1キログラム粒剤	1kg	湛水 移植後7日～ノビエ4葉期	30日前まで
広葉雑草	バサグラン粒剤	3～4kg	落水 移植後15日～55日	60日前まで
イネ科・広葉雑草	レプラスジャンボ	10パック	湛水 移植後14日～ノビエ4葉期	60日前まで
	ハイカット 1キログラム粒剤	1kg	湛水 移植後15日～ノビエ3.5葉期	60日前まで
	クリンチャーパスME液剤	1000ml(水70～100ℓ)	落水 移植後15日～ノビエ5葉期	50日前まで

※初・中期一発除草剤および中・後期除草剤の使用はそれぞれ1回までとする。

令和6年産水稻栽培管理記入欄

★「作付品種名」「作付面積」「主な作業月日」を記入して下さい。

品種名	5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	中旬	下旬	中旬	下旬	中旬	下旬	中旬	下旬	中旬	下旬	中旬	下旬
作付面積	種子消毒	播種	田植え	雑草防除	穂肥	病害虫防除	出穂日	病害虫防除	収穫			
作業月日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日
作付面積	種子消毒	播種	田植え	雑草防除	穂肥	病害虫防除	出穂日	病害虫防除	収穫			
作業月日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日
作付面積	種子消毒	播種	田植え	雑草防除	穂肥	病害虫防除	出穂日	病害虫防除	収穫			
作業月日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日	/ ~ 日

★農業は保管庫等に入れるなどして、きちんと管理しましょう！

★生産履歴記帳により安全・安心で品質の良い米を消費者に届けよう!!

●農家自ら進めよう。米の消費拡大！

●農薬購入の際は印鑑が必要です。

●稲ワラ・麦ワラは流出防止や土づくりのため、堆肥と交換するか全量すき込みましょう！