


定期的には現場巡回を行い生育を把握し適期管理に努めましょう。

Water management and main work content table. Includes stages like育苗期, 活着期, 穂の発育期, 登熟期. Includes a water level diagram and detailed instructions for irrigation and pest control.

Table of crop management by period. Columns include 播種時, 移植後, 8月上旬, 8月下旬, 9月上旬, 9月下旬. Lists diseases like ウンカ類, コブノメイガ, and recommended treatments.

※昨年紋枯病が発生した場合は、ブーンハーデス箱粒剤 50g/箱を使用する。



土づくり ○収量品質安定のために下記の土壌改良資材を施用しましょう。

Table of soil improvement materials. Columns: 資材名, 施用量(kg/10a), 備考. Lists items like ミネラルG, カキテツ, けい酸加里, アヅミン, 土力の素.

施肥基準 施用量(kg/10a) 籾数過剰による粒の充実不足を防ぐために多肥(特に基肥)栽培は避けること。

Table of fertilization standards. Columns: 成分(N-P-K), 一発肥料の場合, 基肥, 穂肥①, 穂肥②. Includes values for 22-12-10, 14-14-14, 16-0-16.

※一発肥料について:①地力により施肥量を加減する。②葉色が薄く推移するが、肥効が持続するので追肥はしない。③なるべく田植に近い時期に施用する。

令和8年産ヒヨクモチ栽培管理記入欄

Cultivation management record table. Columns: 品種名, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月. Includes rows for 品種名, 作付面積, 作業日.

除草剤防除基準 いぐさ近隣田では使用しない。

Table of weed control standards. Columns: 剤型, 薬剤名, 10a当り使用量, 使用時期, 使用上の注意点. Lists products like エンペラー, トップガンR, サラブレッドGO.

使用上の注意事項
●使用基準を厳守し、適正な使用に努め、降雨直前、直後の処理は避ける。
●散布時に田面を露出させないように注意する。また、藻やワラクスなどの浮遊物がある状態では効果が落ちるので取り除く。

◎中・後期除草剤

Table of mid-late weed control standards. Columns: 雑草の種類, 薬剤名, 10a当り使用量, 使用時期, 収穫前日数. Lists products like クリンチャー, バサグラン, レプラスジャンボ.

※初・中期一発除草剤および中・後期除草剤の使用はそれぞれ1回までとする。
※散布時は、周辺作物に薬剤が飛散しないよう十分注意してください。
※クリンチャーEWを混用せず単剤で散布する際は、効果を高めるため着着剤(サーファクタント30)を加用する。

★農薬は保管庫等に入れるなどして、きちんと管理しましょう! ★生産履歴記帳により安全・安心で品質の良い米を消費者に届けよう!!
★購入・使用のつど、ラベルを確認する! ★農薬の飛散防止に気をつける! ★散布器具はきちんと洗浄する! ★農薬の使用状況を記録する!

●農家自ら進めよう。米の消費拡大! ●農薬購入の際は印鑑が必要です。
●稲ワラ・麦ワラは流出防止や土づくりのため、堆肥と交換するか全量すき込みましょう!